İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.07.2018/11155

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ *	Mildiyö *(Plasmopara viticola)*	1. uygulama 400 ml/100 l su 2. uygulama 500 ml/100 l su 3. uygulama 600 ml/100 l su	21 Gün
ELMA	Karaleke *(Venturia inaequalis)*	1000 ml/100 l su	14 Gün
ŞEFTALİ	Yaprak Kıvırcıklığı *(Taphrina deformans)*	1000 ml/100 l su	14 Gün
ZEYTİN	Halkalı Leke *(Spilocaea oleaginea)*	1000 ml/100l su	-
PORTAKAL	Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması *(Phytohthora citrophthora)*	500 ml/100 l su	14 Gün
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen *(Wilsonomyces carpophylus)*	1. uygulama 1000 ml/100 l su (Dormant dönem) 2. uygulama 600 ml/100 l su (İlkbahar uygulaması) 3. uygulama 600 ml/100 l su (İlkbahar uygulaması)	14 Gün

*** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.**

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:
Bağ mildiyösü
1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem . çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

02 Temmuz 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

TAN TARIM®
ZİRAAT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

AQUA BORDO

(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	M:1	Fungisit (Mantar İlacı)

124 g/l Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
Soluma : Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde , doktora başvurun.
Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.
Ciltle temas: Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ile iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.
Gözlerle temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER
1) Bordo Karışımı
2) 2- (2-nonilfenoksi) etanol; Fosforik asit

ZARARLILIK İŞARETİ

UYARI KELİMESİ
Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ
H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P264: Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
P301+P312: YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİ'ni veya doktoru / hekimi arayın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice kurulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Karışımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

Tan Tarım
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mansuroğlu Mah. 283/12 Sokak No.5/1 D.2-3
35535 - Bayraklı - İ Z M İ R
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir Tic. Sic. Mersis No: 0818003526800012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Bornova V. D. 818 003 5268

Elma karalekesi
1.Uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.Uygulama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3.Uygulama : Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4, ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.
Şeftali yaprak kıvırcıklığı
Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.
Zeytinlerde halkalı leke
Marmara Bölgesinde:
1.Uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2.Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege Bölgesinde:
1.Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2.Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz bölgesinde:
1.Uygulama : Hasattan sonra,
2.Uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ,
3.Uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra , çiçekler açmadan önce yaoılmalıdır.
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması
Meyve enfeksiyonlarına karşı :
1,Uygulama : Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2.Uygulama : Havalar yağışlı giderse 1.Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Gövde enfeksiyonlarına karşı : Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine % 3' lük potasyum permanganat dezenfektan olarak sürülmelidir.
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı)
1.Uygulama : Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2.Uygulama : İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ
AQUA BORDO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup M:1** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **AQUA BORDO**'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısın aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip **(Grup M:1 harici)** bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
AQUA BORDO, diğer ilaçlarla (İnsektisit, Fungisit, Bitki Gelişim Düzenleyicisi vs) karıştırılmadan, tek başına kullanılmalıdır.

02 Temmuz 2018
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

TAN TARIM®
ZİRAAT İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.

AQUA BORDO

(Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı)
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grup	M:1	Fungisit (Mantar İlacı)

124 g/l Metalik Bakıra eşdeğer Bordo Bulamacı

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur.
Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

T.C.
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA
TAN TARIM ZİRAAT İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
283/12 Sokak No: 5/1 D: 2-3 Bayraklı - İZMİR
Tel: 0232 348 50 50 Fax: 0232 348 50 52
FABRİKA: İTOB Organize Sanayi Bölgesi Ekrem Demirtaş Cad. No: 38
Menderes – İZMİR Tel: 0232 799 03 52-53

Tan Tarım
ZİRAAT İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Mansuroğlu Mah. 283/12 Sokak No.5/1 D.2-3
35535 - Bayraklı - İ Z M İ R
Tel: 0.232.348 50 50 Belge Geçer: 348 50 52
İzmir T... Sic. Mersis No: 0818003526808012
Ticaret Sicil No: 51643/K.33603
Bornova V. D. 818 003 5268